



AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 18-10-07038081

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

ILE DE FRANCE

Bulletin Technique n° 34 du 16 octobre 2007 - 1 page

Actualités

Stades

CEREALES : semis en cours à 2 feuilles.
COLZAS : les parcelles les plus avancées atteignent 8-10 feuilles et couvrent le sol. Les dernières levées sont au stade 1-3 feuilles.

Chrysomèle

La campagne de surveillance et de piégeage de la chrysomèle des racines du maïs est maintenant terminée. Aucun insecte n'a été capturé en Ile de France et en Picardie, pour la deuxième année consécutive. **Il s'agit d'un succès pour tous les acteurs qui ont été mobilisés dans la lutte contre la chrysomèle, depuis sa détection en région parisienne en 2002, que ce soit pour les campagnes de traitement ou la mise en œuvre des rotations.**

Ce résultat entraîne donc la fin des mesures de lutte obligatoires, telles qu'elles étaient définies par l'arrêté ministériel du 9 février 2006, notamment l'extension des rotations à la zone tampon.

La menace chrysomèle reste toutefois permanente, comme le démontrent les multiples découvertes dans d'autres régions en 2007. C'est pourquoi, nous vous recommandons fortement de continuer d'appliquer au maximum ces mesures de rotation, afin d'éviter de nouvelles installations de chrysomèles, et ce tout particulièrement dans les secteurs où des chrysomèles avaient été piégées, et à proximité des aéroports (quelques kilomètres) qui constituent autant de points d'entrées possibles.

Une décision européenne a d'ailleurs été prise dans ce sens en date du 11 août 2006, afin de prendre des mesures de précaution autour des aéroports ; décision qui ne devrait pas tarder à être retranscrite au niveau français.

Ravageurs céréales

Des **cicadelles** *Psammotettix alienus* sont capturées sur l'ensemble de nos pièges jaunes englués, mais les niveaux ne sont pas très élevés (1 à 11 captures / site). Seul le site en vallée de Marne (Saint Jean les Deux Jumeaux-77) présente une valeur plus forte avec 29 cicadelles. L'expérience des années précédentes montre qu'il est rare d'avoir de la nuisibilité en dessous de 50 captures hebdomadaires.

Pour les **pucerons**, les infestations sont variables d'une situation à l'autre : absence de pucerons, présence de quelques ailés, installation d'aptères.

Quelques exemples relevés ce lundi :

Lisses (91) blé 1 feuille - 2% pucerons
 Bullion (78) blé 1 feuille - 2% pucerons
 Marly la Ville (95) blé 2 feuilles - 9% pucerons
 Amponville (77) orge 1-2 feuilles - 4% pucerons.

Surveillez attentivement les parcelles levées, surtout si l'environnement est favorable (parcelle abritée, proximité de bois ou de maïs....) Intervenir dès le seuil de 10% de plantes porteuses de pucerons, ou si maintien de petites populations 8-10 jours.

Ravageurs colza

Les infestations de **pucerons verts** (ou de pucerons cendrés) stagnent ou diminuent. Si certaines parcelles dépassent toujours 20-25% de pieds touchés, le nombre de pucerons par plante reste faible.

Le vol de **grosses altises** est en nette diminution, schéma assez habituel à cette époque de l'année.

Les captures de **charançon du bourgeon terminal** sont rares et faibles. Seuls 5% de nos sites présentaient au moins un individu contre 30% la semaine passée.

On n'observe pas de chenilles défoliatrices. Par contre, les premières galeries de **mouche du chou** sont visibles dans l'est (secteur Ferté Gaucher - Provins) et le sud Seine et Marne (Bray / Seine, Egreville, Château Landon, Le Chatelet en Brie..).

Enfin, on relève comme l'an passé la présence d'aleurodes dans certaines parcelles.

Hormis des infestations fortes de pucerons sur des colzas peu avancés, pas d'insecticide nécessaire.

Maladies colza

L'**oïdium** est surtout installé dans l'extrême sud Seine et Marne (Egreville - Château Landon) avec pratiquement 100% de pieds porteurs. Présence plus faible (15-30% des pieds) à Poigny (77), Ballancourt, Saint Vrain, Monnerville (91)..

Les macules de **phoma** sont visibles dans de plus en plus de parcelles, notamment dans le Val d'Oise et le nord Seine et Marne, et dans l'Essonne. On a ainsi plus de 50% de pieds avec taches à Chars, Livilliers, Marly la Ville (95), Saint Vrain (91), Fontaine le port (77).. et 15-30% des pieds à Ivry, Varreddes (77), Bullion, Neauphlette (78), Abbeville la rivière, Guigneville / Essonne (91), Cléry en Vexin (95)....

Les variétés qui semblent actuellement les plus concernées sont KADORE, FLASH, ARTIST..

Compte tenu des sensibilités variétales, et du stade (il s'agit de parcelles entre 6 et 9 feuilles), ces attaques ne présentent pas de caractère de gravité.



MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
ET DE LA PÊCHE

Direction Régionale et
Interdépartementale de
l'Agriculture et de la
Forêt
Service Régional de la
Protection des Végétaux
ILE DE FRANCE
10 rue du séminaire
94516 RUNGIS cedex
Tél : 01-41-73-48-00
Fax : 01-41-73-48-48


Bulletin réalisé avec la
participation de la
FREDON Ile de France

Imprimé à la station
D'Alertes
Agricoles de Rungis
Directeur gérant :
N. THERRE

Publication périodique
C.P.A.P.
n°0909 B 07113
ISSN n°0767-5542

Tarifs individuels 2007:
80 euros (papier)
72 euros (fax)
66 euros (mail)

D3 5° 30 48785



P163